


تقرير المجتمع لتقييم الموارد والاحتياجات الصحية لمجتمع السرطان (CHRNA) الأمريكيين ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (SWANA)

الغرض من استبيان Cancer CHRNA لعام 2021-2022 هو تحديد العوامل حول تفاوتات السرطان والموارد المتاحة بين سكان الأقليات العرقية والإثنية والمهاجرين في منطقة التجمع في مركز Perlmutter Cancer Center التابع لجامعة NYU Langone (النصف السفلي من مانهاتن وجميع سكان بروكلين وكوينز ولونج آيلاند).


تم تحديد الأشخاص ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا على أنه: أفغاني، أو جزائري، أو مصري، أو إيراني، أو عراقي، أو إسرائيلي، أو أردني، أو لبناني، أو مغربي، أو فلسطيني، أو سعودي، أو سوري، أو يمني.

خصائص المشاركين ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا في Cancer CHRNA




لغة الاستبيان بين المشاركين ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا في Cancer CHRNA

أجرى استبيانًا باللغة العربية 73.6% n=215
أجرى استطلاعًا باللغة الإنجليزية 26.7% n=78



إجمالي الأشخاص ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (العدد = 292)	الاستبيان باللغة الإنجليزية (العدد = 77)	الاستبيان باللغة العربية (العدد = 214)
العمر، المتوسط (النطاق)	31 (18، 85)	52 (18، 85)
أنتى التعليم	55.3	55.9
أقل من المدرسة الثانوية	10.5	22.3
المدرسة الثانوية/بعض الدراسة الجامعية	36.8	40.9
خريج كلية	52.6	36.7
متزوج/يعيش مع شريك	45.5	50.2
مولود في الخارج	60.0	88.7

نسبة البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا والذين لا يملكون تأمينًا



انعدام الأمن الغذائي 1



العربية (العدد = 215)




الإنجليزية (العدد = 77)



الأشخاص ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (العدد = 293)



الكل (العدد = 2630)



المفتاح



المشاركين الأمريكيين ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا الذين شاركوا في الاستبيان باللغة العربية



المشاركين الأمريكيين ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا الذين شاركوا في الاستبيان باللغة الإنجليزية





جميع المشاركين الأمريكيين ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا



جميع المشاركين في Cancer CHRNA

تدخين السجائر


الأشرطة المنقطعة - لم يدخن أبدًا
الأشرطة المخططة - مدخن سابق
الأشرطة المصمتة - مدخن حالي




لم يكن حجم العينة كبيرًا بما يكفي لإظهار النسبة المئوية للتدخين بين المشاركين الذكور ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا الذين شاركوا في الاستبيان باللغة الإنجليزية.

الإجهاد 2

الإجهاد الذي عانيت منه خلال الشهر الماضي



مقياس درجة الوحدة 3، 4



تتراوح درجات الوحدة المحتملة من 11 إلى 44 درجة، وتشير الدرجات الأعلى إلى زيادة الوحدة

المفتاح



المشاركين الأمريكيين ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا الذين شاركوا في الاستبيان باللغة العربية



المشاركين الأمريكيين ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا الذين شاركوا في الاستبيان باللغة الإنجليزية



جميع المشاركين الأمريكيين ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا



جميع المشاركين في Cancer CHRNA

الرعاية الصحية



العربية (العدد = 215)

الإنجليزية (العدد = 74)

الأشخاص ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (العدد = 290)

الكل (العدد = 2615)



النسبة المئوية للذين احتاجوا زيارة الطبيب خلال 12 شهرًا الماضية ولم يستطيعوا القيام بذلك بسبب التكلفة

فحص السرطان




فحص سرطان الثدي^{7,6}

الإنثاء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و75 عامًا واللاتي خضعن لتصوير الثدي الشعاعي في العام الماضي

سرطان القولون والمستقيم (فحص CRC)⁵

البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و75 عامًا والذين خضعوا لاختبار فحص CRC في الفترة الزمنية الموصى بها


هدف الأشخاص الأصحاء لعام 2030 68.3%




الكل
(العدد = 843)



الأشخاص ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا
(العدد = 92)




العربية
(العدد = 78)



الكل
(العدد = 1085)



الأشخاص ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا
(العدد = 137)



العربية
(العدد = 115)

توصية تستند إلى إرشادات الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد، والتي لا تتماشى مع هدف مقياس *Healthy People 2030* البالغ 80.3% (من بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و74 عامًا واللاتي خضعن لتصوير الثدي الشعاعي في العامين الماضيين، إرشادات USPSTF).

التوصية بناءً على إرشادات USPSTF (1): اختبار الدم الخفي في البراز (FOBT) خلال العام الماضي؛ (2) التنظير السيني خلال السنوات الـ 5 الماضية؛ أو (3) تنظير القولون خلال السنوات الـ 10 الماضية.


فحص سرطان عنق الرحم⁸

الإنثاء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و65 عامًا واللاتي خضعن لاختبار مسحة عنق الرحم في السنوات الـ 3 الماضية

فحص سرطان البروستاتا

الذكور الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر والذين سبق لهم الخضوع لاختبار PSA

هدف الأشخاص الأصحاء لعام 2030 79.2%



الكل
(العدد = 1267)




الأشخاص ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا
(العدد = 121)




الإنجليزية
(العدد = 35)



العربية
(العدد = 86)



الكل
(العدد = 339)



الأشخاص ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا
(العدد = 59)



العربية
(العدد = 47)

توصية بناءً على إرشادات الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد.

لا يتضمن *Healthy People 2030* هدفًا معياريًا لاختبارات PSA.

ملاحظات:

لم يكن حجم العينة كبيرًا بما يكفي لإظهار النسبة المئوية لمن خضعوا لاختبار فحص CRC، أو تصوير الثدي الشعاعي في العام الماضي، أو اختبار PSA بين المشاركين ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا الذين شاركوا في الاستبيان باللغة الإنجليزية.

المفتاح



المشاركين الأمريكيين ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا الذين شاركوا في الاستبيان باللغة العربية



المشاركين الأمريكيين ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا الذين شاركوا في الاستبيان باللغة الإنجليزية



جميع المشاركين الأمريكيين ذوي الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا



جميع المشاركين في Cancer CHRNA

1. Hager, E. R., Quigg, A. M., Black, M. M., Coleman, S. M., Heeren, T., Rose-Jacobs, R., Cook, J. T., Ettinger de Cuba, S. A., Casey, P. H., Chilton, M., Cutts, D. B., Meyers A. F., Frank, D. A. (2010). Development and Validity of a 2-Item Screen to Identify Families at Risk for Food Insecurity. *Pediatrics*, 126(1), 26-32.
2. Cottrell, E. K., Dambrun, K., Cowburn, S., Mossman, N., Bunce, A. E., Marino, M., Krancari, M., & Gold, R. (2019). Variation in Electronic Health Record Documentation of Social Determinants of Health Across a National Network of Community Health Centers. *American Journal of Preventive Medicine*, 57(6 Suppl 1), S65–S73.
3. Russell, D., Peplau, L. A., & Ferguson, M. L. (1978). Developing a measure of loneliness. *Journal of Personality Assessment*, 42(3), 290–294.
4. Lee, J., & Cagle, J. G. (2017). Validating the 11-Item Revised University of California Los Angeles Scale to Assess Loneliness Among Older Adults: An Evaluation of Factor Structure and Other Measurement Properties. *The American Journal of Geriatric Psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry*, 25(11), 1173–1183.
5. U.S. Preventive Services Task Force. Colorectal Cancer: Screening. 2021. Available from: <https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/colorectal-cancer-screening>
6. The American College of Obstetricians and Clinicians. Breast Cancer Risk Assessment and Screening in Average-Risk Women. July 2017. Available from: <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-bulletin/articles/2017/07/breast-cancer-risk-assessment-and-screening-in-average-risk-women>
7. U.S. Preventive Services Task Force. Breast Cancer: Screening. 2016. Available from: <https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/breast-cancer-screening>
8. The American College of Obstetricians and Gynecologists. Updated Cervical Cancer Screening Guidelines April 2021 [December 18, 2023]. Available from: <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2021/04/updated-cervical-cancer-screening-guidelines>.

شكر وتقدير

لقد تم دعم البحث الذي تم نشره في هذا المنشور جزئيًا من خلال جائزة المعهد الوطني للسرطان التابع للمعاهد الوطنية للصحة رقم P30CA016087، وجائزة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (New York City Cancer Outreach Network in Neighborhoods for Equity and Community Translation) رقم U01DP006643، ولورين ساندز وجيمس ريان الثالث، ومؤسسة ساندز لدعم الأسرة، ومؤسسة ديون رود. يتحمل المؤلفون وحدهم مسؤولية محتوى هذا التقرير ولا يمثل بالضرورة وجهات النظر الرسمية لوكالات التمويل. نود أن نشكر الأفراد والمجموعات التالية شخصيًا: (1) العاملين في مجال الصحة المجتمعية لدينا والمتدربين وفريق العمل: ليس ليناغ، الزهراء أحمد، ألكسندر تريغونوف، أبيهة كاظمي، أنا سيخارولينزي، ريم علي، سيسيليا شاباني، كيمبرلي تشارلز، كونيكاشاهل، ليفانغ تشن، سومبال ماري، بينا سونج؛ و(2) المجلس الاستشاري المجتمعي لمركز بيرلموتر للسرطان لوقتهم، والقيادة والتوجيه في المشروع؛ وشبكة من شركاء المجتمع والمناصرة: الجمعية الأمريكية للسرطان، مركز دعم الأسرة العربي الأمريكي، CAMBA، معهد آرثر أش للصحة الحضرية، جمعية صحة المرأة الكاريبية، مركز الحياة الأسرية، مجلس التخطيط الصيني الأمريكي، HealthFirst، وزارة الصحة والصحة العقلية في نيويورك، شراكة RiseBoro المجتمعية، دعم مرضى السرطان SHARE، وتحالف تمكين المرأة في نيويورك. وأخيرًا، نتوجه بالشكر إلى شركائنا المجتمعيين الذين قاموا بتوجيهنا طوال العملية: مركز بروكلين للحياة الجيدة، والأمريكيين الهائبيين المتحدين من أجل التقدم، +RUSA LGBTQ، وبيت إديث وكارل ماركس بنسونهيرست المجتمعي اليهودي، وبرنامج NORC التابع لشورفرونت YM-YWHA، وجمعية حي برايتون، والأمريكيين الآسيويين من أجل المساواة، وخدمات المجتمع الكورية، وكنيسة السلام العربية اللوثرية، ومركز الرعاية النهارية للبالغين الاجتماعي للعائلة السعيدة، ومجلس جنوب آسيا للخدمات الاجتماعية. الأيقونات من ريان تو آر، وأيقونيو، وتحسين تاهيل، وجيني توموك، وأيقونوسي، وريستي_اغنسبا، وصوفيا، وبيتر فان دريل، وiconsmind.com عبر مشروع Noun.

الاقتباس المقترح: Nguyễn CH، وWyatt LC، وYusuf Y، وFusster V، وSifuentes S، وTranh-Shevrin C، وKwon SC، وLura، وIsaac Perlmuter Cancer Center في NYU Langone Health - وهو مركز شامل للسرطان يُعَيِّنُه المعهد القومي للسرطان. تقرير مجتمع تقييم الاحتياجات والموارد الصحية لمجتمع السرطان (CHRNA): الأمريكيون ذوو الأصول من جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (SWANA). مارس 2024.

المفتاح

جميع المشاركين في
Cancer CHRNA

جميع المشاركين الأمريكيين ذوي
الأصول من جنوب غرب آسيا
وشمال أفريقيا

المشاركين الأمريكيين ذوي
الأصول من جنوب غرب آسيا
وشمال أفريقيا الذين شاركوا في
الاستبيان باللغة الإنجليزية

المشاركين الأمريكيين ذوي الأصول من جنوب
غرب آسيا وشمال أفريقيا الذين شاركوا في
الاستبيان باللغة العربية

عربي