



Nombre genérico: IBUPROFEN (IBUPROFENO)

Nombre comercial: Motrin[®], Advil[®], Pedia-Profen[®]

Dosis: Su hijo tomará _____ de ibuprofen _____ vez/veces todos los días.

¿Qué cantidad de ibuprofen debo darle a mi hijo y cuándo debo hacerlo?

- Debo darle _____ cada vez que le dé ibuprofen.
- Debo darle ibuprofen a las _____.

¿Cómo actúa ibuprofen?

- Trata la fiebre y el dolor.
- Trata la inflamación (hinchazón) del tejido cardíaco.

¿Cómo administro ibuprofen?

- Adminístrelo todos los días aproximadamente a la misma hora.
- Administre con alimentos o líquidos.
- Pregúntele al farmacéutico cómo guardar este medicamento.
- Para el medicamento líquido:
 - Agite bien antes de usar.
 - Mida el líquido con una jeringa.
 - Coloque la punta de la jeringa en el costado de la boca de su hijo.
 - Empuje el émbolo para administrar el medicamento.

¿Qué pasa si mi hijo regurgita o vomita después de tomar ibuprofen?

- Si su hijo regurgita o vomita, NO le dé otra dosis de inmediato. Espere hasta el próximo momento en que su hijo deba tomar el medicamento.
- Si su hijo regurgita o vomita dos dosis seguidas, llame al cardiólogo de su hijo.

¿Qué pasa si mi hijo no toma una dosis de ibuprofen?

- SI FALTAN 6 HORAS O MÁS para el horario en que su hijo debe volver a tomar ibuprofen, dele el medicamento. Administre la dosis siguiente en el horario habitual [ver horario(s) más arriba].
- SI FALTAN MENOS DE 6 HORAS para el horario en que su hijo debe volver a tomar ibuprofen, NO le dé el medicamento. Espere hasta el próximo momento en que su hijo deba tomar el medicamento.
- Si su hijo no toma 2 dosis seguidas, llame al cardiólogo de su hijo.
- **Nunca intente compensar las dosis omitidas administrando medicamento adicional.**

¿Cuáles son los efectos secundarios habituales de ibuprofen?

- Malestar estomacal

Esta información no detalla todos los usos y efectos secundarios posibles de este medicamento.
Si tiene más preguntas, llame al cardiólogo de su hijo.



- Fatiga (sentirse muy cansado)
- Dolor de cabeza

Llame a su médico si su hijo presenta:

- Dolor de estómago intenso (muy fuerte)
- Náuseas o vómitos
- Orina (pis) sanguinolenta o color rosa
- Deposiciones pegajosas, sanguinolentas o negras
- Vómitos con sangre o vómitos semejantes a la borra de café
- Mareos
- Hinchazón de la cara, manos o pies
- Fiebre
- Erupción o ampollas en la piel
- Zumbido en los oídos
- Dejar de orinar (hacer pis)
- Visión borrosa o problemas para ver

Esta información no detalla todos los usos y efectos secundarios posibles de este medicamento.
Si tiene más preguntas, llame al cardiólogo de su hijo.